

Estados Unidos**DECENAS MUEREN
POR OLA DE FRIO**

(Detalles en Página 5).

"Píldora" Causa de Niños con Fallas Cardíacas

BOSTON, 12 enero (AP). Las mujeres que usan píldoras anticonceptivas y otras hormonas femeninas durante el embarazo son doblemente propensas que las que no lo hacen a tener niños con afecciones cardíacas, según muestra un estudio.

Una encuesta de mujeres embarazadas, analizada en la Universidad de Boston, reveló el creciente riesgo de afecciones cardíacas en los hijos de mujeres que toman dos hormonas femeninas habitualmente prescritas, el estrógeno y la progesterona.

La mayor parte de los inconvenientes, según se determinó, ocurrían entre mujeres que tomaban la píldora, a veces accidentalmente, durante el segundo y tercer mes de

embarazo.

Los resultados del estudio, llevado a cabo por los médicos de la Unidad de Epidemiología de las Drogas del Centro Médico de la Universidad de Boston, serán publicados en la edición de mañana de la revista de medicina de Nueva Inglaterra.

Habitualmente, se ordena a las mujeres que suspendan el consumo de píldoras anticonceptivas cuando quedan embarazadas. Los médicos sostienen que los problemas ocurren cuando las mujeres no se dan cuenta que están en cinta.

Los médicos determinaron una tasa de 18 niños de cada 1.000 nacidos con afecciones cardíacas, entre las mujeres que consumían píldoras durante los primeros meses del

embarazo. Esa tasa se reduce a 8 cada 1.000 en los niños nacidos de madres que no ingerían la pastilla.

"Las hormonas femeninas ingeridas en las primeras etapas de la concepción pueden perturbar el desarrollo cardiovascular normal del feto", indicaron los autores del estudio. "Tanto los estrógenos como las progesteronas se asocian con la aparición de males cardíacos congénitos en los recién nacidos", agregan.

A veces, las mujeres reciben la indicación de consumir hormonas sexuales femeninas de parte de médicos, que creen que las píldoras disminuyen la probabilidad de fracaso en la concepción.

Los médicos de la Universidad

bostoniana determinaron que sobre 50.282 embarazadas encuestadas, 1.042 recibieron las hormonas durante el comienzo de su concepción y 19 dieron a luz niños con trastornos cardíacos.

Las estadísticas analizadas por los médicos eran parte de un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Desórdenes y Enfermedades Neurológicas y Transmisibles. El informe contiene información compilada en 12 hospitales de los Estados Unidos y cubre a mujeres que estuvieron embarazadas entre 1958 y 1965.

El estudio de la Universidad de Boston fue financiado por contratos con el Instituto y la Administración de Alimentos y Medicinas.

**Se Posesionan
de Calles
Capitalinas.**

Al suspenderse la vigilancia por parte de policías municipales en el sector comercial de San Salvador, las vendedoras ambulantes se han posesionado de las aceras y calles, sin importarle el obstáculo que presentan a los transeúntes y automovilistas. La vigilancia ha sido suprimida a causa del incidente que se suscitó entre policías municipales y soldados de la fuerza aérea que cuidaban el edificio de ANTEL. Los propietarios de los negocios piden la colaboración de los demás cuerpos de seguridad para que desalojen las calles. (Foto de Alvarez).