


Capítulo V

Análisis e Interpretación de Resultados.

El instrumento se aplicó en tres hospitales en el área de San Salvador tales como: Hospital Nacional Rosales, Hospital Nacional Zacamil “Doctor Juan José Fernández”, y Hospital de San Bartolo “Enfermera Angélica Vidal de Najarro”; se encuestaron a 383 personas que visitaron, dichos hospitales, de los cuales un 53.79% su visita era en condición de pacientes y un 46.21% como acompañantes.

De la población encuestada el 60.31 % eran mujeres, mientras que el 39.69% fueron hombres, cuyas edades oscilaban entre los 25 años o más, además se tomó en cuenta su estado familiar, su condición laboral y el sector en el que trabaja, estos criterios sirvieron para dar mayor riqueza de información acerca de los sujetos dentro de la investigación.


En lo referente al conocimiento que manejan los usuarios de Salud Pública, sobre la enfermedad de Parkinson, se logró identificar que de una muestra de 383 personas solo 214 expresaron haber escuchado hablar sobre la enfermedad, pero según los resultados de estos 214 que equivale el 55.87%, se puede observar que existe un número entre 98 y 114 personas que no conocen sobre Parkinson o manejan una mala información sobre ella.



En relación a la importancia del apoyo psicológico, se puede analizar que de 214 personas encuestadas un número de 55 a 91 personas que equivale entre el 25.70% y el 42.52%. Se puede interpretar que son pocas las personas que están en desacuerdo, con respecto a la ayuda psicológica, ya sea para pacientes, familiares o cuidadores.

Además se investigó la importancia de la divulgación relacionada a la enfermedad de Parkinson, en donde un porcentaje del 93% considera que es importante la divulgación, pero el 7% considera que no es importante. Se puede comprender que a pesar de que existen 214 personas que manifestaron conocer sobre la enfermedad, consideran que es importante la divulgación, las vías más sobresalientes fueron los medios de comunicación, charlas, folletos y otros.

Para una mejor interpretación de los resultados que se obtuvieron por medio del cuestionario que se aplicó a 383 personas, se procedió a tabular los datos pregunta por pregunta, desde los datos generales, hasta las preguntas propias sobre la enfermedad de Parkinson; se presentan los datos cuantitativos en tablas y gráficos de barra simple de la siguiente forma:




DATOS GENERALES

Indicador: Sexo del Encuestado

Tabla #1.

HOSPITALES	SEXO				TOTAL	TOTAL%
	MASCULINO		FEMENINO			
	F	%	F	%		
ROSALES	99	25.85	142	37.07	241	62.92%
ZACAMIL	38	9.93	54	14.10	92	24.03%
SAN BARTOLO	15	3.91	35	9.14	50	13.05%
TOTAL	152	39.69	231	60.31	383	100%

Grafico #1



Interpretación

Los datos reflejan que la población femenina es la que mayor demanda asistencial hospitalaria presenta; con un 60.31% de la muestra y la población masculina representará el 39.69%.




Indicador: Edad del Encuestado

Tabla #2.


HOSPITALES	EDAD										TOTAL	TOTAL %
	25-35		36-46		47-57		58-68		69- MAS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
ROSALES	95	24.8	57	14.88	58	15.14	16	4.18	15	3.92	241	62.92%
ZACAMIL	39	10.18	18	4.71	17	4.44	11	2.87	7	1.83	92	24.03%
SAN BARTOLO	31	8.10	5	1.30	9	2.35	4	1.04	1	0.26	50	13.05%
TOTAL	165	43.08	80	20.89	84	21.93	31	8.09	23	6.01	383	100

Gráfico #2



Interpretación

Los datos reflejan que en la población encuestada el rango de edades más sobresalientes oscila entre 25 a 35 años de edad con un porcentaje del 43.08% y las edades de 47 a 57 años representan el 21.93% y el 20.89% lo representan de 36 a 46 años de edad siendo los tres porcentajes más altos. Según el gráfico, es significativo mencionar que la población joven es la que más utiliza el sistema de salud pública. Mientras que el porcentaje de adultos mayores suman únicamente el 14.1% de las personas encuestadas, porcentaje que representa la población que podría ser afectada por parkinson.




Indicador: Estado Familiar.

Tabla #3.

HOSPITAL ES	EDAD								TOTAL	TOTAL %
	SOLTERO		CASADO		DIVORCIAD O		VIUDO			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
ROSALES	93	24.28	94	24.54	29	7.57	25	6.53	241	62.92
ZACAMIL	29	7.57	43	11.23	11	2.87	9	2.35	92	24.04
SAN BARTOLO	19	4.96	28	7.31	4	0.79	0	0	50	13.06
TOTAL	141	36.81	165	43.08	43	11.23	34	8.88	383	100

Grafico #3



Interpretación

Los datos reflejan que el 43.08% de la población encuestada es casada, el 36.81% es soltera y el 11.23 es divorciada.




Indicador: Condición Laboral

Tabla #4.

HOSPITALES	TRABAJA				TOTAL	TOTAL%
	SI		NO			
	F	%	F	%		
ROSALES	155	40.47	86	22.45	241	62.92
ZACAMIL	50	13.05	42	10.97	92	24.02
SAN BARTOLO	16	4.18	34	8.88	50	13.06
TOTAL	221	57.70	162	42.30	383	100

Grafico #4



Interpretación

Los datos reflejan que el 57.70% de los encuestados cuentan con empleo, mientras que el 42.30% son desempleados, siendo mínima la diferencia las personas empleadas y las personas desempleadas. Se puede observar que existe un alto nivel de empleados que utilizan la salud pública




Indicador: Sector en el que laboran (público o privado)

Tabla #5.

HOSPITALES	TRABAJA				TOTAL	TOTAL%
	PUBLICO		PRIVADO			
	F	%	F	%		
ROSALES	61	27.60	94	42.53	155	70.13
ZACAMIL	11	4.98	39	17.65	50	22.63
SAN BARTOLO	4	1.81	12	5.43	16	7.24
TOTAL	76	34.39	145	65.61	221	100

Grafico #5



Interpretación

Los datos reflejan que un 65.61% de los encuestados trabajan en el sector privado y el 34.39% labora en el sector público. Se puede interpretar que este porcentaje de personas que cuentan con empleo hacen uso del servicio hospitalario público debido a las dificultades que atraviesan el I.S.S.S.


Indicador: Condición en la que visita el Hospital (paciente, acompañante)

Tabla #6.



HOSPITALES	CONDICION DEL ENCUESTADO				TOTAL	TOTAL%
	PACIENTE		ACOMPANANTE			
	F	%	F	%		
ROSALES	135	35.25	106	27.68	241	62.92
ZACAMIL	51	13.32	41	10.70	92	24.03
SAN BARTOLO	20	5.22	30	7.83	50	13.05
TOTAL	206	53.79	177	46.21	383	100

Grafico #6



Interpretación

Al evaluar la condición de los 383 encuestados en términos de si son pacientes o acompañantes se encontró que el 53.79% son pacientes y el 46.21% son acompañantes. Se puede observar una diferencia entre las visitas que realizan las personas, ya sea en calidad de paciente o acompañante.




Pregunta #1.

¿Ha escuchado usted, hablar de la enfermedad de Parkinson?


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	214	55.87%
NO	169	44.13%
TOTAL	383	100%

Grafico #1



Interpretación.

De la población encuestada el 55.87% dijo que “Si” han escuchado, hablar de la enfermedad de Parkinson y el 44.13% expresa no haber escuchado hablar sobre esta enfermedad. Los datos reflejan que más de la mitad han escuchado por lo menos hablar de la enfermedad de Parkinson; pero existe un porcentaje representativo el cual no conoce nada sobre la enfermedad.




Pregunta #2.

El encuestado tenía que identificar el origen de la enfermedad de Parkinson.

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
PSICOLÓGICA	34	15.89%
FÍSICA	34	15.89%
NEUROLÓGICA	116	54.20%
MENTAL	30	14.02%
TOTAL	214	100%

Grafico #2




Interpretación.

De los encuestados 54.20% consideran que es de tipo neurológica, el 15.89% consideran que es Psicológica y Física y un 14.02% consideran que es de tipo mental. Se puede observar que más de la mitad conocen que tipo de enfermedad es, pero existe dentro de esa misma población en 45.70% que no conocen realmente que tipo de enfermedad es.


Pregunta #3.

¿Es curable la enfermedad de Parkinson?



RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	36	16.82%
NO	178	83.18%
TOTAL	214	100%

Grafico #3



Interpretación.

El 83.18% considera que la enfermedad de Parkinson “no es curable” y el 16.82% manifiesta que “Si es curable”. Un porcentaje bastante alto conoce que la enfermedad no es curable pero se mantiene un mínimo porcentaje no logra identificar las características más comunes.

Pregunta #4.


¿A que edad consideraban los encuestados que se podía desarrollar la enfermedad de Parkinson; tomando en cuenta los siguientes rangos de edad?.

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
20-30 AÑOS	21	9.81%



30-40 AÑOS	76	35.51%
50 O MÁS	114	54.68%
TOTAL	214	100%

Grafico #4



Interpretación.

El 54.68% de los encuestados manifiesto que la enfermedad de Parkinson se puede dar entre los 50 años o más, el 35.51% dijo que de los 30 a 40 años y el 9.81% dijo que de 20 a 30 años. Se puede observar que los datos son variados pero siempre dentro del rango en la que la enfermedad se desarrolla realmente a puntando más hacia las edades avanzadas, por lo que se puede decir que de 214 que escucharon de la enfermedad. La mayoría conoce en que edad se desarrolla.




Pregunta #5.

Se le pedía al encuestado que trasladara un número específico a las características que consideraron que eran de la enfermedad de Parkinson.


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
DOLOR DE CABEZA	55	10.26%
FIEBRE	22	4.10%
TEMBLOR EN LAS MANOS	161	30.04%
DOLOR DE ESTOMAGO	22	4.10%
RIGIDEZ MUSCULOS	147	27.43%
PERDIDA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS	129	24.07%
TOTAL	536	100%

Grafico #5



Interpretación.

De la población encuestada el 30.04% declaro que el temblor en las manos es una característica que pertenece a la enfermedad, el 27.43% manifiesto que la rigidez muscular y el 24.07% que la perdida de las actividades diarias es otra característica de la enfermedad. Estos datos reflejan que un 81.54% conocen los síntomas más comunes de la enfermedad aunque no todos ellos; destacando principalmente el temblor en las manos, pero existe un 18.46% que no pudieron identificar los síntomas de la enfermedad.




Pregunta #6.

Los encuestados trasladaron u número determinado hacia los procesos que según ellos eran afectados en la enfermedad de Parkinson.

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
LA MEMORIA	163	28.95%
EL AFECTO	74	13.14%
LA VISION	55	9.77%
EL GUSTO	31	5.51%
EL LENGUAJE	123	21.85%
LA SENSACION	117	20.78%
TOTAL	536	100%

Grafico #6




Interpretación.

El 28.95% dijo que la memoria es un aspecto que se ve afectado por la enfermedad de Parkinson, el 21.85% manifestó que el lenguaje y la sensación obtuvo un 20.78%. En este nivel de conocimiento de la enfermedad los encuestados mostraron dificultad para reconocer cuales procesos son afectados realmente, obteniendo la mayor puntuación la memoria, el cual es afectado solo en pacientes con Alzheimer, pero no en la enfermedad de Parkinson y el lenguaje y la sensación muestran un porcentaje menor, lo cual muestra que son pocos los que conocen información más específica de la enfermedad y no solo generalidades.

Pregunta #7.


Se le pregunto a los encuestados si consideraban necesario que un enfermo de Parkinson, debería ser



hospitalizado. Obteniendo los siguientes resultados.


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	90	42.06%
NO	124	57.94%
TOTAL	214	100%

Grafico #7



Interpretación.

De una población de 214 encuestados que han escuchado de la enfermedad de Parkinson solo el 57.94% consideraron que las personas con la enfermedad no debe de ser hospitalizadas y un 42.06% expresaron que las personas con esta enfermedad deben de ser hospitalizadas. Más de la mitad de dicha población conoce que un enfermo de Parkinson puede vivir sin hospitalización; pero aun se mantiene un alto porcentaje que a pesar de expresar conocer la enfermedad siguen sin conocer las características más comunes.




Pregunta #8.

Se le pregunto a los encuestados si los pacientes con Parkinson podían movilizarse por si mismos.


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	101	47.20%
NO	113	52.80%
TOTAL	214	100%

Grafico #8



Interpretación.

El 52.80% creen que las personas no pueden movilizarse por si solos y el 47.20% cree que si pueden movilizarse por sí mismos. Existe un alto porcentaje que no manejan la información correcta sobre el desplazamiento de un enfermo de Parkinson; esto quiere decir que no conocen los estados en que los pacientes son muy activos (Fase On) o cuando la levodopa se desconecta causando un estado pasivo (Fase Off). Solo un porcentaje menor reconoce que los pacientes pueden movilizarse por si mismos.




Pregunta #9.

¿Cuál de los siguientes medicamentos utilizan los enfermos de Parkinson?


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ACETAMINOFEN	57	26.64%
PENICILINA	41	19.16%
INSULINA	44	20.56%
L-DOPA	72	33.64%
TOTAL	214	100%

Grafico #9



Interpretación.

El 33.64% manifestaron que el medicamento utilizado por los enfermos de Parkinson es la “L-Dopa”, el 26.64% consideran que es la acetaminofen y el 20.56% dijo que era la insulina. Se puede interpretar que de un 100% de la población solo un 33.64% conoce que la L-Dopa es el tratamiento para la enfermedad de Parkinson, el resto de la población no conoce como se puede tratar la enfermedad.




Pregunta #10.

El encuestado tenía que marcar porque causa consideraban que se desarrollaba la enfermedad de Parkinson obteniendo los siguientes resultados.


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	35	16.36%
MUERTE DE LAS CELULAS DEL CEREBRO	99	46.26%
VEJEZ	63	29.44%
ACCIDENTES	17	7.94%
TOTAL	214	100%

Gráfico #10



Interpretación.

De la población encuestada el 46.26% considera que la causa de la enfermedad de Parkinson es la muerte de la célula del cerebro, el 29.44% dijo que la vejez, el consumo de alcohol y drogas obtuvo el 16.36%. Se puede observar que un porcentaje muy significativo conoce que la enfermedad se desarrolla por muerte de las células en el cerebro, aunque




sigue predominando un porcentaje significativo de desconocimiento de la enfermedad.

Pregunta #11.

¿Considera usted que sería importante el apoyo psicológico en el momento que la enfermedad es descubierta?


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	144	67.29%
NO	70	32.71%
TOTAL	214	100%

Grafico #11



Interpretación.

El 67.29% considera que sería importante el apoyo psicológico en el momento que la enfermedad es descubierta y el 32.71% manifestó que no es importante el apoyo psicológico.




Pregunta #12.

Se le pregunto al encuestado si un paciente con la enfermedad de Parkinson puede superar una depresión sin asistencia psicológica. Obteniendo la siguiente información.


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	91	42.52%
NO	123	57.48%
TOTAL	214	100%

Grafico #12



Interpretación.

El 57.48% consideran que los pacientes con la enfermedad de Parkinson no pueden manejar la depresión sin asistencia psicológica y el 42.52% dijo que si pueden manejar la depresión. Se puede observar según los resultados que un alto porcentaje de la población total (383) esta conciente de la importancia del apoyo psicológico para superar una depresión causada por la enfermedad. Aunque existe un porcentaje menor que expresa que no era necesario el apoyo psicológico para la depresión, esto se puede deber a que no relacionan la enfermedad de Parkinson con la depresión.




Pregunta #13.

Se le pregunto al encuestado si será necesaria la asistencia psicológica para los familiares y cuidadores de pacientes con Parkinson obteniendo los siguientes resultados:


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	159	74.30%
NO	55	25.70%
TOTAL	214	100%

Grafico #13



Interpretación.

De la población encuestada el 74.30% considera que si es necesaria la asistencia psicológica para familiares y cuidadores de los pacientes con la enfermedad de Parkinson y el 25.70% que no necesitan la asistencia psicológica familiares y cuidadores. Según los resultados se puede observar que un alto porcentaje de la población encuestada creen que la asistencia psicológica puede ayudar a los familiares y cuidadores a sobre llevar la enfermedad.




Pregunta #14.

Se les pregunto a los encuestados si era necesario un manual o guía para que explique que es la enfermedad


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	199	93.00%
NO	15	7.00%
TOTAL	214	100%

Grafico #14



Interpretación.

El 93.00% manifestó que es necesario tener un manual o guía que explique acerca de la enfermedad de Parkinson y el 7.00% dijo que no era necesario un manual o guía. Según los resultados casi toda la población encuestada creen que es necesario un manual o guía que explique que es la enfermedad; se puede observar el interés que tienen por conocer de una enfermedad que no pueden reconocer.




Pregunta #15.

¿Por cual de los siguientes motivos es necesario tener un folleto o guía?


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
PARA CONOCER ACERCA DE LA ENFERMEDAD	137	64.02%
IDENTIFICAR LA ENFERMEDAD A TIEMPO	40	18.69%
SABER LOS CUIDADOS NECESARIOS	12	5.61%
CONOCIMIENTO GENERAL	25	11.68%
TOTAL	214	100%

Grafico #15



Interpretación.

El 64.02% dijo que es necesario tener un folleto para conocer acerca de la enfermedad, el 18.69% dijo que para identificar la enfermedad a tiempo y el 11.68% es necesario el folleto para tener un conocimiento general. Según los resultados los rangos más sobresalientes el porque era necesario el manual o guía de la enfermedad de Parkinson para conocer más sobre la enfermedad e identificarla a tiempo, se puede observar que la mayor parte de la población no cuentan con una información verdadera de la enfermedad.




Pregunta #16.1.

Se le pregunto al encuestado si consideraba necesario que fuera divulgada la información sobre

Parkinson:


RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	204	95.33%
NO	10	4.67%
TOTAL	214	100%

Grafico #16.1



Interpretación.

De la población encuestada el 95.33% considera necesario que la información a cerca de la enfermedad de Parkinson sea divulgada y el 4.67% manifestó que no es necesario. Según los resultados la mayor parte de la población creen necesario que se de a conocer la enfermedad, confirmando así que son pocas las personas que manejan una información exacta sobre la enfermedad.




Pregunta #16.2.

Los medios que consideran los encuestados más significativos son los siguientes:

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	199	41.29%
HOSPITALES /CHARLAS	149	30.91%
ESCUELAS	26	5.39%
FOLLETOS	108	22.41%
TOTAL	482	100%

Grafico #16.2



Interpretación.

El 41.29% de la población encuestada respondió que los medios de comunicación es una forma para divulgar la enfermedad de Parkinson, el 30.91% dijo que por medio de Hospitales y Charlas y el 22.41% dijo que el medio para divulgar la enfermedad es por folletos. Se puede observar que los medios de comunicación y la charlas, reflejan en primer lugar que no han sido utilizadas para dar a conocer la enfermedad. Y en segundo lugar son los más accesibles para la población.

