ORIGEN
biblioteca.utec.edu.sv
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

Capitulo VI

Conclusiones.

- Se llego a determinar que de una muestra de 383 sujetos encuestados solo 214 habían escuchado hablar de Parkinson, sin embargo de estos 214 solo un 54% reconocerán características del II nivel de conocimiento de la enfermedad., dejando claro que manejan información general de la enfermedad; pero son incapaces de identificar características de la sintomatología y sus orígenes. Así mismo se puede observar que 169 sujetos de los 383, no han escuchado nada sobre la enfermedad, y si sumando a esto que de los 214 que dijeron haber escuchado de la enfermedad hay un numero de 98 personas que no conocen las características principales o manejan una información errada de la enfermedad de parkinson, suman entonces 267 sujetos, quienes realmente no saben que es parkinson o manejan una mala información de ella.

- Con el fin de determinar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad de Parkinson, en los usuarios del Sistema de Salud Pública a partir de los datos obtenidos durante la investigación de campo, se puede evidenciar que el 70% de la población encuestada se encuentra en el nivel I que representa el desconocimiento de la enfermedad y el 30% se ubica en el II nivel que agrupa a personas capaces de identificar información

ORIGEN
biblioteca.utec.edu.sv
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

generalizada de la enfermedad.

- Es importante mencionar que un porcentaje bastante elevado de la población el 95.33% de los encuestados consideran necesario un programa de divulgación de la enfermedad; y de esta misma población un 41.29% recomendaron todos los medios de comunicación, para promover e informar a la población sobre la enfermedad. Las razones por las que consideran necesaria la divulgación de la información, apuntó más al hecho que: necesitan conocer sobre la enfermedad para poder identificarla a tiempo y tomar las medidas necesarias.

- Referente al apoyo psicológico para los enfermos de Parkinson sus familias y cuidadores un 67.29% están conscientes de la ayuda que significa para estas personas la asistencia psicológica, para así sobrellevar la enfermedad de una mejor forma.